


Avertissements agricoles



BULLETIN PÉRIODIQUE DE LA STATION D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES DE
BOURGOGNE ET FRANCHE-COMTÉ

MINISTÈRE DE L'AGRICULTURE SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX
Z.I. NORD - B.P. 194 - 21206 BEAUNE CÉDEX

ABONNEMENT ANNUEL : 105 F Régisseur Recettes O.D.A. CCP DIJON 340512 K



☎ (80)22.19.38

ÉDITION GRANDES CULTURES

Bulletin n° 13 - 22 mai 1985

COLZA

- CHARANCONS DES SILIQUES : toujours peu fréquents
- CYLINDROSPORIOSE : Evolution sur feuilles supérieures (variable selon les situations)
- ALTERNARIA : Symptômes très rares.

Selon les situations et les variétés les stades végétatifs se répartissent entre G1 (10 premières siliques ont moins de 2 cm) et G4 (10 premières siliques bosselées).

CYLINDROSPORIOSE

- De nombreuses applications fongicides ont été faites depuis environ 2 semaines.
- Dans les parcelles fortement attaquées en mars-avril et n'ayant pas reçu de traitements, une nette évolution de la maladie est observée sur feuilles supérieures, avec passage sur siliques.
- Dans les parcelles faiblement attaquées en mars-avril et n'ayant pas reçu de traitements, fongicides, le passage sur feuilles supérieures est irrégulier selon les situations.
- Dans les parcelles traitées en mars-avril, l'évolution sur feuilles supérieures est beaucoup plus faible.

PRECONISATIONS :

- Si des symptômes sont fréquemment observés sur les feuilles supérieures, faites une intervention dès que possible
- Préférez SPORTAK PF 1,5 l/ha.

ALTERNARIA

- Les symptômes d'alternaria sont très rares, même sur les feuilles basses : n'envisagez pas de traitement dans l'immédiat. Attendez.

CÉRÉALES

CE QUI EST URGENT

- Protection fongicide des orges et escourgeons d'hiver en retard
- Protection fongicide sur blé d'hiver en avance ou non protégé et atteint de septoriose.

CE QUI PEUT ÊTRE UTILE

- Protection fongicide des blés d'hiver
- Régulateur en rattrapage sur blés d'hiver en retard
- Fongicides sur orges de printemps avec rhynchosporiose et oïdium
- Surveillance limaces, noctuelles sur maïs.

CE QUI EST INUTILE

- Applications insecticides sur céréales d'hiver.

824

BLE TENDRE D'HIVER

STADE VEGETATIF : - Plaine : gonflement
 - Plateaux et semis tardifs : sortie dernière feuille

MALADIES :

Toujours assez peu de Septoriose nodorum et évolution de tritici (taches avec ponctuations) sur F4 et F3 : risque très important.

Augmentation sensible de l'oïdium encore plus marquée en bordure de bois.

RAVAGEURS : pas de pucerons sur feuillage alors qu'en 1984 ils étaient présents en de nombreuses zones : risque faible à court terme.

STRATEGIE DE LUTTE :

Dans la plupart des situations plus de 10 jours de pluie ont été constatés depuis le début du mois de mai. La climatologie reste perturbée. **Les septorioses présentent donc actuellement le risque majeur.**

Dans ces conditions :

► **Blé non protégé au stade 6-7 ou après :**

- pas de septoriose sur F3 attendez à mi-épiaison
- septoriose fréquente sur F3 appliquez dès que possible un fongicide **très efficace vis-à-vis des septorioses.**

► **Blé protégé au stade 6-7 :**

- **cas général : attendez à mi-épiaison**
- Si la mi-épiaison est atteinte (cas rare) : intervenez alors avec un fongicide à large spectre d'action dans les parcelles à bon potentiel (à prévoir entre le 25 mai et le 5 juin).
 Sur les parcelles à faible potentiel n'envisagez une protection qu'en présence de maladies sur la F3 (3ème feuille en dessous de l'épi).

ORGE D'HIVER

STADE VEGETATIF : Début à fin épiaison

MALADIES : Evolution de la rhynchosporiose, de l'oïdium, localement de l'helminthosporiose et de la rouille naine.

STRATEGIE DE LUTTE :

En situation normale la protection a déjà dû être assurée, pour les parcelles en retard (altitude, variété, date de semis) elle doit être encore appliquée jusqu'au début de l'épiaison en suivant les préconisations de notre dernier bulletin n° 12 du 15 mai.

ORGE DE PRINTEMPS

STADE VEGETATIF : Très variable en fonction de la date de semis et des conditions de levée.

MALADIES : Premières contaminations de rhynchosporiose et d'oïdium.

STRATEGIE DE LUTTE : Ne traitez qu'en présence de ces maladies sur les étages foliaires moyens ou supérieurs.